

2-7 周産期死亡率(変更前の定義:出生千対)の国際比較

	昭和45年 (1970)	昭和55年 (1980)	平成2年 (1990)	平成7年 (1995)	平成12年 (2000)	平成20年(2008)			平成21年(2009)			平成22年(2010)			平成23年(2011)		
						周産期 死亡率	妊娠満28 週以後死 産比 <sup>4)</sup>	早期新生 児死亡率	周産期 死亡率	妊娠満28 週以後死 産比 <sup>4)</sup>	早期新生 児死亡率	周産期 死亡率	妊娠満28 週以後死 産比 <sup>4)</sup>	早期新生 児死亡率	周産期 死亡率	妊娠満28 週以後死 産比 <sup>4)</sup>	早期新生 児死亡率
日本 <sup>1)</sup>	21.7	11.7	5.7	4.7	3.8	2.9	2.0	0.9	2.9	2.1	0.8	2.9	2.0	0.8	3.4	2.6	0.8
カナダ	22.0	10.9	7.7	7.0	6.2	('05)6.3	3.0	3.4	('05)6.3	3.0	3.4	('06)6.1	3.0	3.1	('06)6.1	3.0	3.1
アメリカ合衆国	27.8	14.2	9.3	('96)7.6	7.1	('03)6.8	3.1	3.7	('03)6.8	3.1	3.7	('03)6.8	3.1	3.7	('03)6.8	3.1	3.7
デンマーク	18.0	9.0	8.3	7.5	('01)6.8	('05)6.6	3.8	2.8	('06)8.0	5.3	2.6	('06)8.0	5.3	2.6	('06)8.0	5.3	2.6
フランス	20.7	13.0	8.3	6.6	('99)6.6	('06)11.0	9.5	1.6	('07)10.9	9.2	1.6	('09)13.5	11.8	1.7	('09)13.5	11.8	1.7
ドイツ <sup>2)</sup>	26.7	11.6	6.0	6.9	('99)6.2	('07)5.5	3.5	2.1	('07)5.5	3.5	2.1	('07)5.5	3.5	2.1	('07)5.5	3.5	2.1
ハンガリー	34.5	23.1	14.3	9.0	10.1	('07)7.8	5.0	2.8	('08)7.1	4.3	2.7	('09)7.7	5.4	2.3	('09)7.7	5.4	2.3
イタリア	31.7	17.4	10.4	8.9	('97)6.8	('05)5.1	3.2	1.9	('07)4.5	2.8	1.7	('07)4.5	2.8	1.7	('07)4.5	2.8	1.7
オランダ	18.8	11.1	9.7	8.9	('98)7.9	('06)6.0	3.5	2.5	('07)5.8	3.4	2.4	('08)5.4	3.3	2.1	('08)5.4	3.3	2.1
スペイン	('75)21.1	14.6	7.6	6.0	('99)5.2	('07)4.5	3.1	1.4	('07)3.6	2.2	1.4	('09)3.6	2.2	1.4	('09)3.6	2.2	1.4
スウェーデン	16.5	8.7	6.5	5.3	('02)5.3	('07)4.3	3.0	1.3	('08)4.9	3.6	1.3	('09)5.2	4.0	1.2	('09)5.2	4.0	1.2
イギリス <sup>3)</sup>	23.8	13.4	8.2	7.5	8.2	('03)8.5	5.7	2.8	('03)8.5	5.7	2.8	('03)8.5	5.7	2.8	('03)8.5	5.7	2.8
オーストラリア	21.5	13.5	8.5	6.9	6.0	('05)5.9	2.9	2.9	('05)5.9	2.9	2.9	('05)5.9	2.9	2.9	('05)5.9	2.9	2.9
ニュージーランド	19.8	11.8	7.2	('97)5.7	5.8	('07)5.7	3.5	2.2	('08)6.0	3.6	2.3	('09)4.9	2.8	2.1	('09)4.9	2.8	2.1

資料 厚生労働省「人口動態統計」

WHO「World Health Statistics Annual」

UN「Demographic Yearbook」

1) 国際比較のため周産期死亡は変更前の定義(妊娠満28週以後の死産数に早期新生児死亡数を加えたもの出生千対)を用いている。

2) 1990年までは、旧西ドイツの数値である。

3) 1980年までは、イングランド・ウェールズの数値である。

4) 妊娠満28週以後の死産比 = 年間妊娠満28週以後の死産数 ÷ 年間出生数 × 1,000